

Profilaxis antitetánica en pacientes con heridas

Anamnesis-Información (beneficios de la vacunación - saber cómo actuar si existe reacción)

1^{er} paso

Herida sucia

Anfractuosas, punzantes, contaminada por polvo, heces o tierra, saliva, herida punzante, avulsiones, proyectil, aplastamiento, congelación

Herida limpia

2^o paso

5 o más dosis
Última hace < 10 años

No vacunar

5 o más dosis
Última hace > 10 años

1 dosis recuerdo

3 o 4 dosis
Última hace > 5 años

1 dosis recuerdo

Vacunación incompleta

Completar pauta vacunal +IGT

No vacunación

Pauta vacunal +IGT

Reacción anafiláctica a dosis previa

Administrar IGT Vigilar evolución

5 o más dosis

No vacunar

3 o 4 dosis
Última hace > 10 años

1 dosis recuerdo

Vacunación incompleta

Completar pauta vacunal

No vacunación

Pauta vacunal

Reacción anafiláctica a dosis previa

Administrar IGT Vigilar evolución

3^{er} paso

Información

Observaciones

- Entregar carnet vacunal
- Registrar en la historia clínica
- Vigilar durante 15 minutos, después de la administración
- Conservar vacuna entre +2° y +8° C (nevera)
- Proteger las vacunas de la luz
- Vigilar la caducidad de las vacunas
- IGT: Gamaglobulina Antitetánica

Pauta vacunal: Td

- 1^a dosis
- 2^a dosis vacuna separados por 4-8 semanas de intervalo
- 3^a dosis a los 6 ó 12 meses después de la 2^a dosis
- 4^a dosis de recuerdo a los 10 años
- 5^a dosis de recuerdo a los 10 años después de la 4^a dosis

NO reiniciar vacunación
“Dosis puesta, dosis contada”



Zona de administración de vacunas: deltoides.
No administrar en glúteos



Zona de administración de IGT: cuadrante superior externo glúteos