

Profilaxi antitetànica en pacients amb ferides

Anamnesi / Informació (beneficis de la vacunació - saber com actuar si es produeix reacció)

1r pas

Ferida bruta

Anfractuoses, punxants, contaminada per la pols, femtes o terra, saliva, ferida punxant, avulsions, projectil, aixafament i congelació.

Ferida neta

2n pas

5 o més dosis
De l'última
fa < 10 anys

5 o més dosis
De l'última
fa > 10 anys

3 o 4 dosis
De l'última
fa > 5 anys

Vacunació
incompleta

No
vacunació

Reacció
anafilàctica
a la
dosi prèvia

No vacunar

1 dosi de
record

1 dosi de
record

Completar
pauta
vacunal
+IGT

Pauta
vacunal
+IGT

Administrar
IGT
Vigilar
evolució

5 o més
dosis

3 o 4 dosis
De l'última
fa > 10 anys

Vacunació
incompleta

No
vacunació

Reacció
anafilàctica
a la
dosi prèvia

No vacunar

1 dosi de
record

Completar
pauta
vacunal

Pauta
vacunal

Administrar
IGT
Vigilar
evolució

3r pas

Informació

Observacions

- Entregar carnet vacunal
- Registrar en la història clínica
- Vigilar durant 15 minuts després de l'administració
- Conservar la vacuna entre +2° y +8° C (nevera)
- Protegir les vacunes de la llum
- Vigilar la caducitat de les vacunes
- IGT: gammaglobulina antitetànica


Pauta vacunal: Td

- 1a dosi
- 2a dosi vacuna separada amb 4-8 setmanes d'interval
- 3a dosi als 6 o 12 mesos després de la 2a dosi
- 4a dosi de record als 10 anys
- 5a dosi de record als 10 anys després de la 4a dosi

NO reiniciar vacunació
"Dosi posada, dosi comptada"



Zona d'administració de
vacunes: deltoide. No
administrar al gluti



Zona d'administració d'IGT:
quadrant superior extern gluti